庫全書

子部

欽定四庫

普濟方卷二十五

詳校官太醫院吏目臣宋 桂 編修臣倉聖脈覆勘 總校官原任中名臣王 燕緒 校對官中書臣鮑之種

滕録監生臣 莫與傳

則能受也脾胃之為倉廩 周王朱橚 不能飲食治宜調其 撰

鱼厅四届全書 神仙快活丸 右為末甘草膏子為丸捻作丁香餅子 腸鳴翻胃吐食嘔吐酸水不思飲食心腹痞悶水穀 不消漸成泄痢酒食所傷小兒妳癖 甘松如廣苓稜如檀香分沉香分茯苓分香附子 華澄茄 內菓分砂仁與良薑 白果 白芷分 桂花紅木香 丁香 青皮 陳皮分一官桂 分麝香 益智分大椒十一紅杏圖藿香四五 治婦人男子脾胃不和氣不升降腹脹 卷二十五

Sa. Ties little 十分味沉香透腸湯出德 又方 五噎落塞不通噫氣吞酸口苦失味主之 右為細未白髮糊為丸如梧子每服十九先嚼餅子 脹滿心腹污痛痰逆惡心或時嘔吐飲食减少十 箇後將藥隨嗎津嚥下 蒼木黑色 牽牛致京三稜 皮弦 皂角子仁品 曹齊方 脾胃不和中寒上氣肠肋 酸離菌子以皂角

木香散 多反匹库全書 右吹咀每服四錢水二大蓋薑三大片豪一枚煎至果各二沉香 陳皮養半 八分去浑熱服一方加茯苓去肉豆蔻 乾木瓜姆五益智法桂去粗草豆蔻去乾薑炮高 半夏湖沧七次霍香 厚朴莲汁炒各神鱧炒草 內豆蔻煨白豆蔻 白术配香附妙人參 縮砂仁兩一丁香炎麥縣 温脾胃消食和氣 卷二十五 木香 青皮各半甘草死十

こうしこ 木香煮散出御藥 瓷器盛每服二錢七沸湯點服 口淡無味及解傷寒調順中焦 右搗羅十四味為散研細入生薑自然汁并鹽拌匀 木香 厚朴去粗皮各一分將厚朴屯薑地桂去粗枳實 分生薑白然汁丁香 沉香兩 人参 厚朴去粗皮生薑甘草 白茯苓去黑半夏湯洗七白术 治脾胃不和不能飲食心胸痞悶 鹽

大腸湯 時候 右吹咀每服三錢七水一蓋煎七分去滓熱服不 皮去 豆蔻去收河梨勒娘去 皮氧薑地人參 白茯苓去黑青橘皮湯 大腹当神勉炒厚朴去粗皮生木香当各 去麸 粗訶梨勒炮取大麥藥炒半夏湯洗七遍去乾薑地人參 白茯苓太黑青橘皮的烙去 孤甘草泉到各陳橘皮湯洗去 治脾胃虚飲食不和 N. 卷二十五 核 兩白 檳榔 肉豆蔻 枚剉 拘 消桂

木香丸明論 右為未滴水為九如小豆大每服三二十九温水送 破同煎至七分去滓稍熱服 右㕮咀每服三錢鹽水一蓋入生薑三片豪二枚擘)!!!!! 妙巴豆四 官桂 京三稜炮判 下好殺張陳皮一作半夏四牽牛半斤取苗香 乾薑 两半木香分大黄 和脾胃寬胸膈消痰逆嘔吐進益美食 曹野方 進茂 芫花

一致定匹庫全書 紫蘇九 嚼下 調臟止瀉 右為未煉蜜和丸如彈子大每服一九炒生薑鹽湯 F 皮湯浸去白 紫蘇葉 兩二沉香到人參 治脾胃不和痰唾嘔逆臍腹撮痛心胸痛 Į. 桂皮祖亦茯苓皮黑縮砂仁皮甘草炎 胡椒科 卷二十五 桔梗炒青橘皮湯浸去 東橘 悶

Carlonal lilia 沉香丸 木香丸出里 飲食 七分去滓稍熱食前服 右粗搖篩每服二錢鹽水一蓋入生薑三片同煎至 唐城 東 董地甘草 炎到各 沉香 厚朴盖 料皮生桂 治脾胃氣不和心腹污痛不能飲食 治脾胃不和腹脇脹滿時有疙痛不思 去粗益智去皮白术 £ 附子鬼鬼

多定匹庫全書 髙良薑散 心以生薑橘皮湯下二十九 右為末煉蜜和搖三五百杵丸如梧桐子大每服空 高良董一兩陳橘皮去白焙肉豆蔻去克薑與厚 妙檳榔兩克薑一兩炮郁李仁去皮到機檳榔一克薑一兩炮 木香而桂心而芎藭一附子一两 计炎判 五味子 微妙 香橘皮一两湯浸无活 治脾胃不和飲食减少腹中虚鳴 甘草與白术 婚製川大黄 西 两一 微湯

半夏飲 右搖羅為細散每服二錢陳米飲調下 皮湯浸去白陳橘皮湯浸去紅豆蔻去皮各木香半夏生薑汁乾薑吃各東內培附子吃廳去青橘 各炮 一分青橘皮湯檳榔到 草豆蔻去皮牡丹皮 當歸切木香 件 积實去粮起炒 一两神麴奶半) il... 治脾胃不和不能飲食見食吐逆 一半夏半两别 京三稜 汁搗 和末

白术丸 多厅 四库全書 圆 進食方食散進 嚼下 右為末煉蜜和九如梧桐子大每服三五十九空心 右為末煉蜜和九如雞頭實大每服一九空心米飲 食前鹽湯送下 皮去白甘草致附子腌製去皮乾薑炮製各白术到厚朴失對一套水去根皮炒無萬两青橘 治脾胃不和不能飲食 治脾胃不和不思飲食虚冷嘔逆力 卷:二: Б.

七寳湯 味煮散 弱不能飲食一本門脾胃氣 枚擘破同煎至六分去滓空心温 右搖羅為散每服二錢鹽水一蓋入生薑三片 草豆蔻五枚數裹煨白茯苓去人参再一 厚朴盖汁炙到麥葉少兩吴茱萸湯洗焙人參 桂去粗 無夷做陳橋皮湯洗去白車 操料 治脾胃不和腹中刺痛胃逆氣冷不能飲食 治脾胃氣虚不能飲食 類虚 服 腹皮 四到

發定匹庫全書 沉香湯 擘破同煎至七分去滓温服 右粗搗篩每服三錢葱白三寸擘破入酒童子小便 右粗搖師每服三錢鹽水一蓋入生薑三片來二 楝實 草果剛 沉香到懷香子炒青橘皮去白胡椒 校河梨勒炮去核半夏二分湯浸洗五度 治脾胃不和虚滿不能飲食 陳橘皮去白焙 视 老二十五 華澄茄 黄 量 甘 枚

O. 17 11 LIL 了脾丸 為度去巴豆不用同煎藥為細末醋煮大黄末為丸 右用三稜一 如梧桐子大晒苋每服四十九空心用隨意湯下 細不過數服氣脈正生 各半益同煎至七分去滓温服若氣甚虚弱脈息沉 木香我史君子士殿陳皮五 石熊子一枚燒紅的上黄而白丁香致丁香十錢 和脾寬胸膈消痰逆止嘔吐進益美食 一兩㕮咀用巴豆五錢淨炒豆三稜焦黃 普齊方

草豆蔻湯 健中丸 金 口唇全書 右為未煮棗肉和九如梧桐子大空心米飲送下三 兒如黄米大每服一百丸見黑糞為妙 草豆競去人參 陳橘皮為浸去厚朴去粗皮生 意去考前各 白术 治脾胃不和不能飲食 治脾胃氣冷熱不和進食和氣 厚朴去粗皮生蓝木香 訶梨勒去內豆 卷二十五

和胃丸 吐逆及一切氣疾 右為末煉蜜和杵三二百丸如櫻桃大每服一九鹽 六分去浑食前温服 右粗搖篩每服三錢鹽水一盞入生薑三片同煎至 う!!!!! 兩甘 甘草生高良薑生各藿香葉 丽 治脾胃冷熱不和不能飲食胸膈滿悶痰垂 到桂各半两 桂去粗丁香皮炙

厚朴湯 白豆蔻丸 愛定匹庫全書 擘破同煎至七分去滓温服之 右搖篩每服二錢鹽水一蓋入生薑三片大棗二 湯嚼下空心服 术四鳥樂漫湯甘草矣判各 厚朴去粗皮四两生薑二两陳橘皮湯浸 白豆蔻七两 治脾胃不和化癖氣調中臟及心下伴慎 治脾胃不和不能飲食 N. 老二十五 乾薑炒各 两去 白 白

つんていている 調中丸出御藥 思飲食頭目昏眩小便不清胸膈痞問脇肋膨脹 湯下空心食前 右為細末水煮薄麴糊為丸如桐子大服三五十 丸 右為細未煉蜜和丸如梧桐子每服二十九煎薑專 葛根 赤茯苓 黄芩 半夏湯滑石各二黑牽牛生 大黄 猪苓並去陳皮接白术 治脾胃不和內挾濕燠煩燥發渴不 告野か 桂去粗皮枳殼寒 粮大通各 桔梗 兩用

多定匹庫全書 調中益氣湯出濟生 得時一 温水送不拘時 見一二日一見夏月食泄米穀不化或便後見血見 白膿胸滿短氣咽膈不通或痰嗽稠粘口中沃沫食 舒伸大小便清利而數或上飲下便或大便滋滯 沉重煩心不安忽肥忽瘦四肢懶倦口失滋味復難 人反耳鳴耳聾目中流淚視物昏花努肉紅線熱壅 溢其證四證滿悶肢節煩疼難以屈伸身體 参うする 夫脈強洪緩而沉按之中指下

ろうして これで 肢血脈空服在旦是也如是顯熱燥是下元陰火蒸 右件到如麻豆大作一服水二蓋煎至一蓋去滓帶 蒸發也加生地二分黃藝二分如大便虚不得或大 熱服宿食稍盡服之寧心絕思藥必神効益病在四 頭目不得安臥嗜臥無力不思飲食 引陽 梅皮得通運者加二分氣從陰桶皮三分如腹中氣不 升麻分黄者或甘草五者术加木香或一分或 加人參者去之 柴胡無與脾氣下溜乃補加人參五分有歌柴胡二分二味為東不足 告訴が 上胃

多定 中全書 兼足太陰也病其脈如胸中故顯濕熱相合而生煩 寫五分黄蘗三分時暫一從權而祛濕也不可常用 亂如胃氣不和加湯洗半夏半錢生薑三片有嗽加 身體沉重雖小便數多亦加茯苓二分養术一錢澤 不能除此足太陽經所作也一方作足太陰經也如 生薑生地黄二分以製半夏之毒痰碌頭疼非半夏 便了而不了腹常逼迫皆血虚血溢也加當歸身如 無以上證只服 卷二十五 たいりえ いるう 黄芩謂之桂枝芍藥湯亦如芍藥湯中加之同煎如 芍藥半錢生黄芩二分惡寒腹中痛加中桂三分去 地黄二分如無以上證只服前藥如夏月加白芍藥 右剉如麻豆大依前煎服如魚燥熱加黄栢二分生 三分春月腹中痛尤宜加如惡熱而渴或腹痛加 升麻三分二味為上氣不及胃氣與酒洗橘皮或二分無此避者勿加止二分稱皮如腹中氣不轉運更加一 錢炙甘草與柴胡戶人參有账倉术與黃 普濟方 **用分** 橘木 皮香 錢分 白

此病四時為寒熱温凉也法宜用黄連酒洗酒黄 亦於前樂中作一服服之如夏月有此證為大熱也 茱萸半錢或一錢半湯洗去若觀厭氣多少而用之 逆其證氣上衝咽不得息而喘息有音不得臥用吳 為春脈所逆脇下太陽脈二道而反上行病名曰 分半夏五分以生薑少許製之如秋冬月胃脈四道 酒知母各等分研為細末熟湯為丸如梧桐子大每 冬月腹痛不可用与樂益太寒之樂也只作乾薑三 £ 厰

大き うら 獨聖丸出 **熾惡心噎睡吞酸乾噫食臭腹脇脹滿不思飲食** 膳壓之治飲食勞倦所得之病延虚勞七損證也常 服 以甘温平之甘多辛少是其治也 半碎 夏湯洗丁皮船上烏梅去並畫炮當歸去三稜 一百九白湯送空心不令胃中停留以美肉食早 1. I. Lang 心妙熟三錢研 码砂一两肉桂去粗皮連皮秤半两去皮的砂研究的桂去粗皮 方和 治脾胃不和飲食多傷心腹刺痛嘔 告本方

金丘四母全書 人參煮散出和 盛四肢逆冷 氣嘔吐痰逆寒熱往來或時汗出又治腸胃冷濕泄 思飲食宿寒留飲停植不消或因飲食過度內傷脾 寫注下水穀不分腹中雷鳴脇肋虛滿黑燎傷寒陰 膈少逆消食 每服三九至五九温水下食後服常服化滯氣利胸 右為細末入巴豆硇砂勻水煮麵糊為丸如麻子大 治脾胃不和中脫氣滯心腹脹痛不 卷二十五 大正可見合語 傷脾方 脾不磨方 七分食前空心温服 右為未每服二錢水一盆生薑五片來三箇同煎至 三稜機搗碎丁香皮六茯苓去養术去皮各 參四青皮去白十廿草成十乾薑吃六 但將五膈煎三服 脾虚不磨塞心胸 普濟方 腹滿肚脹如物攻 可送尋常小理中 毒

鱼灯口屋石量 分氣紫蘇飲集戲 服 痛氣促喘急心腹膨脹飲食不思嘔逆不止 右病後傷脾經令人胸膈氣短用寬中散二帖草菓 一箇炭火炮剉水二大蓋薑十片煎八分去滓作四 五味子法梗桑白皮對陳皮并流桔梗對草果仁 病後傷脾胸膈滿 更兼可食惡心來 ヵ 治男子婦人胸膈噎塞腹脇疼 卷二十五 草果寬中煎一碗 老人强食魚必短

Ja. 7 ... 1.1.1. 沉香磨牌散出醫方 五斤搗碎同一處拌勻每服四錢水一 心不思飲食或吐痰水 右㕮咀為粗未秤二十斤淨入揀嫩枝葉氧紫蘇十 人鹽少許煎至七分去租空心食前常服和胃進食 炙木香 沉香 大腹皮 人參發半丁香半 藿香葉去土檀香甘 1 白豆蔻仁 甘草及谷茯苓三 告済か 治脾胃虚冷心腹膨脹嘔逆惡 縮砂 白术 大盞薑三片

多反匹庫全書 婚愁散出仁 服 小腸及外腎腫痛及治婦人血氣攻刺癥瘕塊硬帶 思飲食時或嘔逆霍亂轉筋腹疼泄瀉膀脫氣刺痛 心腹連脇肋刺痛胸膈痞悶背膊連項拘急疼痛不 右㕮咀每服三錢水一蓋薑三片鹽一 下赤白或發寒熱胎前產後惡血不止臍腹疼痛 藥两各半 一方有半夏無白术 治男子婦人脾胃虚冷氣滞不行攻菜 · 捻煎八分温

Na. IT I LILL 進食散出醫方 或因思慮傷動冲和之氣胸膈痞塞腹中怠惰全不 心食前稍熱服之 右為末每服二錢水一盞連根葱白一堃煎七分空 切虚冷不思飲食並宜服之 两肉桂去粗乾薑一两 延胡索丽爹术宿去之一甘草米两茯苓白者蓬 三稜場青皮去白各丁皮 治脾胃虚冷或食生冷或飲食不節 告濟方 縮砂法檳榔各 た

多玩匹库全書 11, 理中湯出 七分去滓温服不拘時 右㕮咀每服四錢水一蓋半薑五片棗子一枚煎至 進食痰逆惡心大便鴻泄 污痛飲酒過度痰逆惡心或時嘔吐心下虚脹 半夏麯 參盖青皮去甘草矣各妙附子 皮臍厚朴去皮 丁香 方和 肉豆 整題 草果仁 治脾胃不和中寒上衝胸脇逆滿心 卷二十五 陳皮去白各 高良薑炒麥葉 膈

東湯出和 ていうこ 空心服 右到碎同碾淹一 胃冷濕泄瀉注下水穀不分腹中雷鳴霍亂吐利手 食 足嚴冷胸脾心痛逆氣嚴氣並治之 塞不通飲食短少短氣羸因温水逐水去濕又治腸 養术然 那生薑五甘草生用鹽炒 1.1.Lin 治脾胃不和乾嘔惡心腹脇脹滿不美飲 宿焙乾暖為末每服一錢沸湯點 普齊方 两十

盈定四库全書 三倍湯出永類 右件入瓷器内淹一宿焙乾為末沸湯點服每服二 錢不拘時候 心或霍或嘔吐心腹刺痛腸鳴泄瀉水穀不分 服一錢入鹽少許沸湯點服常服健脾胃進飲食 右拌匀用盆器盛貯以布益淹一宿焙乾搗為末每 草豆蔻一两去甘草二两生薑五两和皮鹽五 聚去核生薑洗切甘草炙到 N. 治脾胃不和胸滿悶飲食不化嘔进惡 卷二十五 兩

次已四年全書 四 沉香養胃丸出楊氏 丁香大丸子出楊氏 吐利藥性和平不燥但是脾胃虚弱諸疾悉宜服之 湯化下食前服 右件為細末煉蜜為九每一兩作十九每服一九熱 橘皮 兩紫蘇葉雨 人參班蘆丁香 乾薑炮薑黄 持済方 木香 白豆蔻仁 益脾養胃助氣温中進飲食療 和脾養胃温酒食降氣快膈 縮砂仁 神妙多葉妙 甘草炎陳

白术茯苓丸出楊氏 滿乾城遼酸飲食不化腸鳴泄寫酒癖停積嘔吐 或二丸細嚼熟水不拘時候 右件為細末煉蜜為丸每一兩作一十丸每服一丸 沫頭目昏運 寇麴裹恨人參或盛甘草炙乾薑如已上 沉香科木香科縮砂仁十两丁香 白术亦赤茯苓去乾薑炮內桂去粗半夏湯洗 卷二 治脾胃不和胸膈痞悶心腹脹 + 白术 肉豆 痰

たとり見と言 助脾氣令人能食 治胃氣不和飲食减少腹脇脹多強泄 右 米飲下四十丸 右為細末用神妙碾糊為九如梧桐子大每服五十 九生薑湯下不拘時 細研千百遍令如飛塵蒸餅丸如梧桐子大空心 船上黄不以多少 實去粮內豆蔻題聚人冬去蘆頭 普濟方

通心經益脾胃出本 二香養胃丸出楊氏 奫 食嘔吐痰逆嗌氣吞酸口苦無味嗜臥體重腹脇 草炙肉桂去粗檳榔 橘皮去白草薑地三 丁香分木香分陳橘皮白益智子 以動魚作膾食之作美食益人其功與鰤同 卷二 治脾胃不和心下虚痞不思飲 以紫蘇葉并並煮飲食 十五 內豆蔻般裹煨熟已上 縮 *5*) 甘 刺

Kind hithin 升降腹脇服痛嘔逆惡心並宜服之雙棗湯出楊氏 治脾胃不和胸膈不 健 **脾散出楊氏** 右件為細末每服二錢+二枚水一蓋煎至七分或 或二丸細嚼熱湯送下食前 右件為細末煉蜜為丸每一 鹽點亦得 香附子去毛青橘皮去旗处甘草成半 治脾胃不和心腹疼痛嘔逆惡心 治脾胃不和胸膈不快飲食停滞 普濟方 两作一十九每服一九

白豆蔻散出楊氏 逆惡心不思飲食 煎至八分熱服不拘時 右件為細末每服二錢水一蓋生薑三片聚二枚同 右件為細末每服二錢水一蓋入鹽一捻生薑三片 杳 香 人參雖蘆白术姓白茯苓皮丁香名上西味沉香戶縮砂仁炒白豆蔻炒乾生薑各一兩木 陳橘皮去白高良薑五两乾薑也两 治脾胃不和中脫落悶氣升降痰

香术散出楊氏 吐無時 石件為細末別用由一斤生薑一斤切作片子同由 梧桐子大每服一百九温米飲送下空心食前 煮爛不用生薑只將由 去皮核取肉和前樂未九如 煎至七分熱服或用鹽湯點亦得食前 乾生薑广大由 安和脾胃美進飲食治中脫不快喝 和脾胃養三焦美飲食化痰飲破滯 酒拌匀焙乾陳橘皮去白四斤去核温東橘皮去白 普濟方

多克匹库全書 豆蔻煮散出楊氏 煎至七分熱服空心 右件為細末每服三錢水一蓋生薑三片鹽少許同 氣 陳橘皮去肉桂去粗枳殼去粮麸炒巴上细辛 草豆蔻仁 木香 人參強蘆白术 土神勉各二河子六枚煨 白术 健脾和胃治嘔逆惡心不思飲食 卷二十五 白茯苓去皮巴上三高良薑 白茯苓去草豆蔻仁 葉去

大型可見 Ain 時獨皮去甘草矣肉桂去粗人冬盖去粗皮生蓝 陳獨皮去甘草矣肉桂去粗人冬去 草葉飲子出楊氏 食 盖去滓空心食前温服 右件為粗未每服四錢水一盖半鳥梅一枚煎至 草菓子仁 陳橘皮去木香二味各 炒 白豆蔻仁 人參頭 甘草谷半兩丁香三兩白豆蔻仁 人參去蘆甘草矣三味丁香 烏梅內培紫蘇葉去赤茯苓去厚朴 温脾養胃順氣消飲生津液美飲

建中九出 金八四周全書 右件各等分㕮咀每服四錢水一蓋半生薑三片同 煎至一蓋去滓温服不拘時候 右件為細末者來尚為丸如梧桐子大每服十九生 股香人參去 蓝頭木香分數東人參去 蓝頭木香分數 黃小麥葉 典乾 頭 黄神劍炒小麥縣炒乾薑炖已上七內豆蔻半林盖計製 白茯苓皮吴茱萸炒炒黄 白衣家職方 健脾温胃去停寒進飲食 分

Ja In well like 1 補真九出於 大抵不進飲食以脾胃之藥治之多不 丁香五辛丸出楊氏 効者亦有謂馬人之有生不善攝養房勞過度真陽 服三十九至五十九生薑湯下不拘時候 右件為細末生薑自然汁麪糊和丸如梧桐子大每 **薑湯下食前** 丁香 木香 乾薑 味各一两胡椒两半夏二两 告斉か 温中媛胃止吐逆進食消痰

多ケ四年全書 丹田火上蒸脾土脾土温和中焦自治膈 古云補腎不如補脾余謂補脾不若補腎腎氣若 運是致飲食不進胸膈痞塞或不食而脹滿或已食 衰虚炊火不温不能上蒸脾土冲和失而布中州 而不消大腑溏此皆真火衰虚不能蒸瘟脾土而 子去枚 胡蘆巴炒附子炮去陽起石 酒淘 燕沉香不見火 兩應茸去培 川巴戟去鍾乳粉各 的豆炭 要 內從 容酒浸五味 Б. 川鳥炮去克絲子 開能食矣 业 然、 不

建牌散出 穀神 右為細末鹽 鹽湯任下 右為末用羊腰子二對治如食法葱椒酒煮爛入 酒杵糊為九如梧桐子大每服七十九空心食米飲 九山麻方膽 方鹏 白术 **未四** 入两 Į **薑** 選 八 整 各去蘆町 熟 消食化氣飲食不快服之良驗病後 啟 脾進食 服 ·普濟方 炒 少約 許取 作三 餅兩 子淨 焙却 乾為 粉草琴縮砂 盂 進

草豆蔻散出五氏 傷兼療脾泄能和一切冷氣 右為未點煎任意 食亦可 炮三 草菓仁 人と言 董一两白术 分 陳橘 甘草為古 皮切湯 焙切 酯片 炒浸炮一 治脾胃氣不和霍亂不止酒食所 取煦 黄雨 卷二十 四 一两草豆蔻和皮取到子一两炮五、 草两或 两两 淹 五 五味子分甘草 用兩 華去

次ピの手合書 白豆蔻散出王氏 右件六味杵為末每服 米飲下酒傷以酒調下或脾痛不可用者炒生薑酒 右件八味依法修事了杵羅為末每服二錢霍亂冷 下三錢餘即如湯點服 白豆卷 **判碎的桂三** 汁雨 盡為度及取汁浸炙 下生一半熟 积裁者軟 数两用仁一 积 以半 介去 皮 橘皮三两炒河子二两去 治脾胃氣不和止脾泄瀉痢 普濟方 錢水一中蓋薑聚同煎 妙樓以 即住當歸 孟

七傷散出衛 故不思飲食加白扁豆一两蒸用名八珍散此方 右為細末每服二錢水 未如梧桐子大以董擘碎炒黑色入水煎湯下十五 七分稍熱服如要丸用好棗漿水煮去皮核細研為 去放甘草一两微炒甘草已上 白术 方生 7 黄耆蜜水山芋 開胃養氣進食 卷二十 蓋薑棗同煎至七分如大 白茯苓

崇土散出朱氏 とこうことによう 爽時有泄寫之證皆宜服之 右為細未每服三錢沸湯調服日空心三錢或用伏 平不熱每有傷寒瘧疾中暑得差之後以此調脾 三四服十日外飲食倍常 白术 炒少時去皮 粉草煨乾去土到速皮二两黄土粉草半两黄泥裹 草果牛两黄泥果 草果米两黄泥 泥半 治脾土虚弱腎水無畔易致腹滿 普済か 皮泥生三 裹用錢 芙 用錢 縮砂 腹 Ð

金 好四母全書 五補散出朱氏 龍肝煎湯尤妙此方係杭州傅來服之優有効 煎服亦得 病 右為細未鹽湯點下一日三服或用薑三片鹽少 證不生脹亦不作平胃不燥 製厚朴妙淨陳皮去白茴香去土丁香皮不見 梗去內桂去及不木香等 智仁步及縮砂仁妙神妙好草家良量對碎 五臟先補於脾脾土實而飲食自 巻二十 益 進

厚朴湯出朱氏 えのこうに かまる 快牌散出家藏 草炙白术 訶子炮各 电影 厚朴 塞肉各一两巴上 生薑 厚朴 塞肉各一两巴上 右氣實加青皮半兩虚加陳皮半兩細碾為末每服 三錢入燒鹽少許空心沸湯點服 两年草東子士成不生薑四十 治脾胃不和冷寫腹痛 治脾胃不和嘔吐酸水飲食減少 東內各一兩已上用水一碗煎 普香方 鹽 草菓仁炒甘 兩十五五 Ī 子氧

金月四月子書 和中散出衛生 輕健四肢 點服秀王府常用之與他處方不同 右為細末先以生薑切作片子餘樂到碎同鹽一 和盦一宿焙乾碾為細未每服二錢不拘時候沸湯 人参去蘆白茯苓去成白术而黄耆 梗縮砂仁科半夏一两湯 白扁豆半兩薑汁浸一宿然 補脾胃解勞倦退熱止嘔消疾進食 卷二十 Ð, 木香州分霍香葉 去盧甘草

又三日日 江南 四倍九出十便 和 中九出十便 百丸 右為未煉蜜丸如梧桐子大空心食前温米飲服 腹痛進飲食 右為細末每服二大錢水 煎至六分稍熱服不計時候 治脾胃不和寒氣積聚飲食減少 **灶脾胃去寒濕治泄瀉療吐逆除心** 普濟方 **盏蓮五片秦** 烹

金月旦昼日書 厚朴健胃湯此十便 體倦怠 下一粒 右為細未煉蜜和丸如彈子大每服非時以米湯嚼 蓮 切熔乾 好厚朴而半夏而京秦二两甘草一两丁香料生健胃湯則力便 和脾胃化痰涎止逆不思飲食 董 良薑啊烏梅肉 神麵 小麥縣 茴香十两 白茯苓 甘草 卷二十五 蒼 木谷一

一人・・うまから 四君子湯崩方 滓不拘時候 右吹咀每服四錢水一蓋薑七片來一箇煎六分去 病之後宜服此味但味甘恐非快脾之劑常服宜減 甘草一半增損之法見於方後 右件樂為吹咀攪与每服二錢生薑一小塊劈破車 枚水一盖半煎至七分去滓温服不計時 人参 茯苓 白木两一甘草平 治大人小兒脾胃不和中脘痰飲大 一方加橘紅等分名異攻散尤宜病 普濟方 充


金分四月五十 桂湯治停飲目眩 後調理 草加木香熟附子等分名加味四柱散薑囊煎服治 寒不嗜飲食服燥樂不得者大宜服之一方去甘 等分名六君子湯專治素有痰飲胸膈痞悶脾胃虚 暈四肢倦怠小便滑敷泄寫不止病後調理尤宜用 大人氣臟虚真陽氣散兩耳常鳴臍腹冷痛頭眩目 方加黄者白扁豆等分名加味四君子湯大 方去人參加官桂等分甘草减半名甘 卷二十五 方去甘草加枳殼橘紅半夏

大己口臣 台 治脾胃不調 安牌職進飲食益氣方出楊子健萬 之信服者頗効李次仲云看不止面自有奇功 右細杵羅為末每服二錢水一蓋煎取八分空心 口淡無味薑養煎服研為細末服之尤住此方人未 治腸風并五痔下血面色痿黄心松耳鳴脚弱力多 黄橘皮 人参码半丁香 把禁武去藿香各一 中焦逆脹滞氣不宣飲食無味多困少 哲清方 肉豆蔻 甘草 服

强中九此華陀 右細杵羅為未每服二錢水一蓋煎取九分空心學 服三五十九 右等分同為細末湯浸蒸餅捌去和丸如桐子大每 金獲命方 白术或養木亦可陳皮其或薑如良薑油青皮 藿香 桔梗 枇杷葉去木香 草豆蔻 治氣消食益脾胃進飲食 芎 青橘皮 藁本 分各 黄橘皮 甘

23.13.1 Like 養胃丹城經 拘多少湯浸洗七遍焙乾搖羅為末用生薑汁和 食 逆惡心臟寒泄痢腹痛肠鳴常服温中養胃散飲思 右同為細末煉蜜為九每兩作十九每服一九温湯 化下空食前服之或細嚼湯下亦可造變法半夏不 **尤佳半夏麴半** 丁香 平 的豆蔻两人参分甘草米 南龍 里州两 方陀 治脾胃不和全不思食中脘停寒嘔 普斉方

四妙健脾散出十 當歸調中湯出 多玩 四月 全書 至一大蓋去滓温服食前滓再煎以利為度 右吹阻作一服水二大蓋生薑三片大由 發作有時治之當以和中順氣 無力大便難小便數或大便血飲食無味面肌瘦潮熱 子餅乾用之 大黄五當歸或甘草與朴硝於与蔡二 松方岱居 便 進食極妙 卷二十五 治脾胃不和腸鳴腹痛四肢 枚同煎



金月旦屋有電 加减理中湯出十便 麥葉散出十便 滿脇肋脹痛嘔吐惡心口淡無味呼吸寒冷腹暴痛 非時 右為細未每服二錢以水一蓋煎至七分去滓温 飲酒過傷不思飲食常服生養諸無大益脾胃 煎至六分去滓和滓通口服入鹽點亦得不計時候 大麥藥四甘草四 治脾胃不進飲食方 治脾胃不和三焦壅滞胸膈溶 卷二十 服

導引方出朱氏 大三日三八三百 题 右為細末每服 搖三七通牙亦然 漸新 歌身兩手一向偏側急努身舒頭共手競扒相牵 七項前後两角緩舒手如是似向外扒放縱身心 兩 一時盡勢氣共力皆和來去左右亦然各三 去太倉不和臂腰虚悶 **鐵沸湯點服不以時** 普濟方 陳皮西半甘草 内弱故不消飲食雖食亦不能化也尺脈浮滑速疾者 磨而消之則指其氣澤以神諸臟腑今胖臟不足胃氣 金月四月子書 夫脾與胃相為表裏胃為水穀之海主受盛水穀即 白术茯苓湯松藏方 右吹咀每服二兩水二大蓋入生薑五片煎如常法 吐是風邪縣絆於脾胃之間當先實其脾胃 白术 脾胃虚弱氣不能飲食附論 白茯苓 半夏各一炒麵二麥縣題半 治脾氣虚弱身重有痰惡心欲

文三日日上等 要 右為末用栗米飯為丸如泉豆大每服十五丸加至少 桂各州两甘草炙剉胡椒料皮络各半两桔梗炒二芍藥而益智去皮一五味皮湯浸去白桔梗炒二芍藥而益智去皮一五味 木香丸 食不消胖不磨也 木香 治脾胃氣虚思進飲食 懷香子 始砂仁 去青桶皮湯 普濟方 焙浸 去 18 紅 Ħ

木香散出聖 右件 頻絕身心昏暗口舌乾燋四肢無力 三十九生薑湯下如傷水多嚼服亦得 三稜半兩白术而訶梨勒半兩恨厚朴一兩去樂本桂心所遠志一分家門冬一兩五味子兩大香兩人參養頭、白茯苓而當歸一兩到白 香熟 陳橋皮一兩 藥粗羅為未每服三錢以水一中蓋入生薑半 治脾胃氣虚不思飲食精神恐悸上氣 卷二十 穰湯 蓮粗 京

次已日日 Acts 10 沉香陳麵丸 右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸米飲下 膩 分赛三枚煎至六分去滓不計時候温服尽生冷油 皮湯浸去人參 白豆蔻皮麥葉微炒各河梨勒沉香料陳鄉做木香 檳榔割半夏湯洗七陳橘 兩 沉香半陳翹做木香 厚朴去粗皮生白术各二丁香 治脾胃氣食少無力 普濟方 華澄茄 圭

藿香湯 黄耆湯 金月世紀有電 右 空心食前服之 劈破同煎至七分去柤温服不計時 粗搖節每服五錢鹽水一盖半生薑三片來二枚 皮附子炮縣去陳橘皮湯浸去白 桂 黄耆對三甘草矣 厚朴去粗皮生 華華 上去租白术 補燒脾胃止吐逆利胸膈治心腹刺痛進飲 治脾胃虚弱四肢少力肌體羸瘦不欲飲食 熟乾地黄焙人參 卷二十 Б, 當歸始茯苓

大正日日上日 至六分去滓稍熱服不拘候 右粗搖篩每服三錢水一蓋入生薑木瓜各三片煎 食 兩木香 益智去皮縮砂仁去甘草與陳橘皮湯 桂去粗高良薑 藿香葉 選出 方百 白茯苓去黑青橘皮湯浸去細辛去 白建料兩各 治脾胃虚弱并婦人脾血人冷 香熟草豆蔻對甘草與白术 普濟方 白浸人 羕 虽 縮

金月口月八百 白豆蔻散 此藥治腹痛及冷瀉尤妙腹痛最難得此方只是温 右據羅為散每服二錢七入鹽少許沸湯點空心 **脾藥餌時工止痛理不可解** 砂肉 白豆蔻仁 青楠皮去白河梨勒皮各半 稜炮陳桐皮去白大麥蘖少各屯薑炮甘草炙各 治脾氣虚弱不能飲食 厚朴去粗生重切豪肉各一两 桂去粗木香 參西半 麴炒京 成團婦 \equiv 服 乾生

文三り馬と動 厚朴散出聖 肢不和 右件樂搗節為散每服三錢以水一盞入生薑半 湯點服食前 右搖羅為細散每服二錢と生薑三片鹽少許入沸 兩陳橘皮去白穰培甘草後亦到半夏三分湯一陳橘皮一兩湯浸甘草半兩炙半夏三分湯厚朴盖升炙令香熟 人多蘆頭 桂心两白 丁香畔紅豆蔻去西 -治脾胃氣虚弱不能喚食或時痰逆四 普濟方 圭 两白术 滑洗

肢少力疼痛 金灯也是石潭 膩飴糖 右粗搗篩每服三錢鹽水一蓋入生薑半分切來二 東三枚煎至六分去祖不計時候稍熱服忌生冷油 焙去 歸切焙各人參各一厚朴去粗皮生 華陳橋皮湯紅豆競技白术 桂皮粗 訶梨勒機去 黄耆到當 白 治脾胃氣虚不能飲食食即妨悶 四

黄耆湯 油腻濕爽 枚劈破同煎八分去滓温服空心 右粗搞節每服五錢鹽水一盆半入生薑二片聚二 枚劈破同煎至六分去滓不計時候稍熱服忌生冷 福皮湯浸去桔梗炒各厚朴去粗皮生薑桂去黄耆当枳殼去粮人參 白茯苓去黑白术 两 治脾胃氣虚弱進食 普濟方 Ē 一粗 陳

多定四母全書 沉香散出聖 参散出聖 肢不和 腹時痛 煎至六分去滓不計時候稍熱服 右件樂搗篩為散每服三錢以水一中蓋入來三枚 蓮 參 篇頭 白术兩厚朴生薑汁矣令 兩川鳥頭一两炮 桂心 治脾胃無虚弱不能飲食食飲即吐心 治脾胃氣虚弱不能飲食背心常冷四 卷二十五 两一 香皮 熟高良

てき うら ハニ 白木丸出聖 半分來三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服 右件樂搗粗羅為散每服三錢以水一中蓋入生薑 兩乾薑炒三 白术 皮去白术 沉香再人參盧頭 陳橘皮半兩湯浸紅豆歲三 神妙陳橘皮湯浸去白人參 桂心各半 治理胃氣虚弱不能飲食肌膚瘦痒面 曹商力 Ē

白术丸 金丘四库全書 右搗篩蜜和丸如梧子大酒服二十九日再服加至 右羅為末者妻面和九如梧桐子大每服以粥飲下 三十五九忌桃李崔肉大酢生菜生葱猪肉冷水 三十九不計時候 茯苓 白术 炮吴茱萸六遠志五分旋復花四澤寫五 療惡心數吐水不能多食少心力者 茯神 轧畫 人參 當歸 厚朴矣桂心谷八細辛 枳實炒五味子 附子各六各

大二日前 たま 助胃膏出傳信 主胃氣寒弱食則吐逆從朝至夜不得食食入腹則脹 右據節為散空腹煮生薑湯服方寸七日服漸加至 泄瀉等疾 氣滿急大便出飯粒故帶酸氣而贏計日漸困者方 一七思生葱桃李雀肉海藻松菜 吴茱萸四白术两人 翹末 N. 麥蘇私至黄色厚朴上 大肚脾胃及治惡心嘔吐不思飲食 普濟方 人参 乾薑 兩 甘草炙五味子 桂心 4

延年人參飲 右為細末煉蜜為九如彈子大食前白湯下一丸小 兒尤宜服一方無白豆蔻 去四 皮箇 香鐵內豆蔻與做山藥四白豆蔻一十四縮砂 生薑切时草以 麥門冬去橘皮 白术 丁香 甘草多白茯苓 白术巴上各木 主虚客熱不能食恶心 厚朴各二茯苓

とれしりら たふう 厚朴煎丸出醫方 厚补湯 雀肉酢物 肉 右件切以水四升煮一升二合分為三服忌食桃李 右切以水八升分為三服日三忌海 厚朴之兩白术 婀 療不能食腹內冷氣 補腎不如補理脾胃氣肚則能飲 普濟方 參為二茯苓 西生薑 兩桶皮 藻菘菜桃李雀

金元四月子書 此藥大補脾胃虚損温中降氣化痰進飲食 血是以素問云精不足補之以味形不足補之以 食飲食既進能生榮衛榮衛既旺滋養骨髓保精 件厚朴等為細未者豪肉為九如豪肉不合却 梓 轧去 厚生 四世草培的上尚香一厚朴焙乾 川薑地 洲 汗用 厚朴半斤去 瓦 将川畫四两八十年斤日水五八十年 卷二十五 雨附子去 用到升到 水作於作 一指 銀大 皮兩耳面器指 **磨炮銀大内面** 煮 製器用 大 内甘水却 煮草盡用 椒 水四却生 氣 益 用

ここうこと ハルラ 又方出时 又方出財 右件皆熬令黄香捣節丸如彈子大服一枚稍增之 速效一方有故紙無川椒 下先搗千百杵後丸此藥温中降氣化痰進食極有 題清糊少許如梧桐子大每服五六十九空心米飲 魏半麥縣五致五杏仁二 升薑州茱萸斤鹽大 普香方 彈 义

叉方 利之 右熬令黄捣蜜丸如桐子大服三十九日三若大冷 右以合傷蜜和如彈丸日三服一方無鹽為末服 可加克薑三兩若患腹痛加當歸三兩羸弱加甘草 二兩并長將息徐以變术法療產後心下停水仍須 术介麵斤 治脾虚胃乏不思飲食 卷二十 5

これでき かか 人参丸 右為未煉蜜和丸如雞黄大每服一丸水一蓋入東 右搗羅為散每服二錢七食前米飲調下日三 枚劈破同煎至六分和滓温服或爛嚼煎水湯下 附子婚製去皮 半兩白术分甘草分 草豆蔻去皮青橘皮湯浸去高良薑 人参四白术半 乾薑两半甘草民對一山芋 治脾胃虚弱不能飲食心腹刺痛頻併泄 両 普濟方 訶梨勒皮 痱

多定四库全書 人参散 白豆蔻散 右粗搗篩每服三錢七水一盞入生薑二片棗二枚 右搗羅為散每服二錢七入鹽少許沸湯點服食前 亦得 焙甘草炙沉香到 白豆蔻仁 人参 白茯苓皮黑山芋 白术錢 治脾胃氣弱不進飲食 治脾胃氣弱不進飲食 厚朴去粗皮生白术 陳橘皮湯 甘草生分到 白浸

大三日日 在一日 右五味用水一石煮煎為度去橘皮黑豆甘草只取 疾久服補脾胃壯氣進食去風 進者用樂末一錢七水一中蓋入紫蘇木瓜煎至四 分去滓放温併喫二服 劈破同煎至七分去滓温服小兒諸疾未痊乳食不 草烏頭洗淨養术二陳橘皮去白甘草生推黑豆 升三 治脾胃虚弱及久積冷氣飲食减少腹內諸 普濟方 100 100

必勝散 金月世紀石雪 草豆蔻撥刀散 時候 鹽湯或温酒下三十九 草鳥頭着术二味日暴乾粗搗篩焙乾為末酒煮勢 右搗羅為散每服二錢七入鹽少許沸湯點服不拘 糊丸如梧桐子大焙乾收瓷器中每日空心晚食前 白术 治脾氣虚弱不思飲食 甘草矣五味子做妙各乾薑炖三 治脾胃氣虚弱嘔逆不能飲食 卷二十五

人子一日多一八十五 生畫煎 空腹食之 右件藥前二味細對和勾以水一中蓋煮取二合并 右件藥用銀鍋子內都攬令勾以慢火熬成煎每服生薑半斤研白蜜斗人參末啊 生薑汁溲白麪四兩為撥刀以半肉臛汁內煮令熟 不計時候以熱粥飲調下一茶匙 草豆蔻二枚高良薑科生薑汁半 治脾胃氣虚弱不能飲食 告濟方 置

山芋丸 金万四月五十 薑蜜煎 前各一 前温米飲下 右為細末煮白髮糊丸如小豆每服三十丸空心食 右以慢火煎如稀錫每服半匙温酒化服空心晚食 生薑什一蜜一生地黄头一煎 治脾胃氣虚弱不能飲食肌體黃瘦 山芋 白术的一人参 治脾胃虚弱思進飲食 **P** 卷二十五

大日日日 八五日 草豆蔻散 備急經健脾丸 不利心腹刺痛方見本門兼領脾胃類 加附子二两炮去皮臍 未麪糊丸如梧桐子大每服三五十九空心米飲下 右先入鍋內猛火炒勻攬候紫焦傾出為粗未每服 一斤入良薑四兩乾薑四兩炮製神麵四兩同為 厚朴一斤去聚二斤去生薑一斤去 治脾胃氣虚弱不思飲食吐並滿悶胸膈 暖脾胃增進飲食 普濟方 細

金万世月子書 叉方 薤白湯 服差止右以水七升煮雄餘五升內諸藥煮取一升半分三 右搗篩以蜜拌食後酒服之方寸七 弱百病因此而生 政心熬未麥蘖 她各一蜀椒一斤乾薑一斤 雄白斤枳實三两大東十二 粳米二致七 療中虚冷不能飲食食輕不消羸瘦四肢匹 卷二十五

又方 Ka. Jaiol Lithia 又方 右搗節為未以蜜和丸如彈子大一枚漸增之食後 右以蜜三斤於銅器中湯煎上可丸梧桐子大每服 服 七九至十九日再服 大黄 魏半斤麥縣五升杏仁皮尖熬 芍藥各半斤芒硝半 哲濟方 毕

麻仁散出时 療脾胃氣微不能下食五內中冷時微下痢室口厚有書 卷二十五 藻松菜桃李雀肉等物 右搖篩蜜和丸如梧子大空腹温酒服二十九日二 食殺不消並皆可服 服漸加至三十九腹中有痛加當歸二兩思食輕海 白木內神雞东五兩甘草二兩乾薑四枳實二兩 大麻仁斗大黄豆点升併 療脾胃氣弱水穀不得下遂成不復受

次已四五合 神 魏九出聖 右為末煉蜜和搗勻丸如梧桐子大不計時以粥下 放無力 睡恒不足 右搗節食前飲服一二方寸と七日四五服 白豆蔻一两 日草微赤到附子一两的粮粮桂心雨 詞梨勒二兩做黄胡椒兩厚朴 通外 治 脾胃氣虚冷腹脇氣脹不思飲食四 普濟方 住 剉 炮 橘

豆蔻煮散 便滑泄 服空腹日二服 右搖維為散每服三錢ヒ水一蓋煎至七分去滓温 三十九是生冷油膩濕麫 寇, 故 白术 甘草炎對各白茯苓去黑皮 黄耆到各克木瓜料河梨勒皮分三肉豆 治脾胃虚冷嘔逆不思飲食臍腹污痛大 高良薑 卷二 十五 陳橘皮湯浸去木香

次已日日 在島 厚朴煮散 進食散出醫方 食前服 虚全不食者只一二服便覺能食 右為細末每服二錢水一大蓋生薑五片煎至七 青橘皮養陳橘皮白高良薑婦切肉豆蔻去肉桂 粗甘草灰各草葉肉豆蔻川鳥頭炮各 核 治脾胃虚冷腸滑泄痢腹多脹滿嘔逆不 治脾胃虚冷不思飲食及久病 告濟方 学九 箇訶子 胛

金灯口屋台灣 煮朴丸出百 腹痛 思飲羸瘦 服空腹日二 右搗羅為末每服三錢ヒ水一蓋煎至七分去滓温 董炮各草豆蔻 提去皮 厚朴去粗皮生高良薑 白茯苓去黑皮各內豆蔻煨去殼甘草炙乾 健脾胃療中寒止腹痛進飲食及治 苍二十 五 白术 乾木瓜当各

異攻散出落生 人三日日人品 题 右以水二升醋一升酒二升慢火煮令酒醋水盡焙去核生薑一斤淨洗連 乾為細末別用事內和九如梧桐子大每服五十九 食 温米飲下空心食前 厚朴去粗皮益智速青皮去陳皮去青鹽四大 參 茯苓 白木 甘草炒陳皮分等 治脾胃虚冷腸鳴腹痛自利不思飲 哲情方

金月四月有量 用腳魚半的細切起作館沸豉汁熱投之着胡椒鵯突美出財 治脾胃氣冷不能下食虚弱無力 治脾胃氣冷食入口即吐出 右為細末每服五錢水二大蓋薑三片來二枚煎至 蓋去滓食前温服先用数服以正其氣 羊肉半勧去脂膜切作生以蒜虀五味醬醋空腹 **氧薑時莊橋皮等未空腹食之** 食 卷二十五

焼脾散出 欠己の巨白馬 治 剌腹脇撮痛服効 翻胃臍腹刺痛嘔惡心不思飲食及療婦人血氣攻 脾胃虚冷 赤芍藥 乾搗篩陳倉米煮粥飲丸如梧桐子大每服三五 十丸湯使任用甚效 用温州白乾薑一物將水煮令透心潤濕取出焙 方和 Ų 乾薑 與各六良薑十兩甘草成四 不下食積久瘦弱成察者出 治脾胃虚弱冷寒積冷心氣脾痛冷痰 昔済方

右件為細末煉蜜為丸每一兩作十丸每服一丸細皮乾薑地附子炮將縮砂仁各一兩 神趣 大丁香 人參強 蘆木香 胡椒 茴香 肉桂牡 補胖丸出楊氏 惰嗜臥噎塞不通 痢不止不思飲食嘔吐痰逆面色痿黄肌肉消瘦怠 右為未每服一大錢作一服白湯點下不拘時 治中焦不和脾胃虚弱心腹疼痛

次巴马耳公馬 大養脾丸 嚼米飲下食前 少食並宜服之 脹嘔吐不止倦怠嗜臥及大病之後氣血虚羸胃弱 茯苓去成丁香四乾河子煨去縮砂仁 参頭 白木 炒一两畫 治脾胃久虚不進飲食胸膈痞悶腹脇膨 丁香半乾薑炖二肉桂去粗 半汁 附子炮去車撥 普濟方 白豆蔻 肉豆熟酪 紅 甘草雨 Ē 至 久 胡 椒

沉香丸 噫酷吞酷惡心嘔逆四肢倦情心腹疼痛飲食减少 泄瀉無度大能補養脾胃助氣消穀若禀受怯弱飲 食易傷最宜服之 湯化下或水煎五七沸亦得空心食前 右為細末煉蜜為丸每一兩作一十丸每服一丸白 沉香 肉桂去粗 白豆蔻仁 治脾胃虚弱食久不化胸膈痞悶腹脇膨脹 木香 青橘皮占草豆蔻仁 五. 縮砂仁各一兩 白术 极外出

肚脾丸 欠四日尾白雪 國 心腹脹滿飲食不入精神怠惰睡臥不安並宜服之 桐子大每服五十九生薑湯下不拘時候 右件為細末用神雞末一斤生薑汁作糊為丸如梧 汁製吴菜<u>英</u>湯洗七次四 半夏薑汁七味京三稜炮香莲我大鬼切厚朴 陳橋皮去乾薑地高良薑奶香附子炒小麥葉 治脾胃久弱中焦停飲腹内虚鳴或多泄痢 附子重六錢上河子肉 普濟方 華撥

高良量丸 空心食前米飲吞下 右件為細末煮東內為丸如梧桐子大每服五十 止不思飲食 華澄茄 概未之 縮砂仁兩甘草六錢與果日晒乾 神颜各七錢生萬一兩所爛神趣已上七味 白茯苓皮人參頭 肉豆竟处聚恨已 治脾胃虚弱中脘停寒心腹作痛泄瀉不 烏樂 陳橘皮は沉香 熟义六錢 两乾薑炮 拌研細去 与糯切粗 熟米以皮 丸

とこりうことう 消穀丸 治脾胃氣弱飲食多傷胸膈痞悶不思飲食 生薑湯化下食前 右件為細未煉蜜為丸每一兩作一十九每服一九 熨牧泉 三稜炮陳橋皮岳麥縣好四味木香科肉豆蔻一枚數檳榔枚一神麴二兩青橋皮去京 草各一兩炒丁香分車澄茄分縮砂仁再內豆蔻 高良薑而乾薑炮內桂去粗 普濟方 八參去蘆白木 香 甘

右件㕮咀每服五錢水一盆半生薑十片大事二枚巴上九味附子八錢重者二 息然外一厚朴去租皮甘草炙鳥梅肉焙縮砂仁 盖煮乾 厚朴盖科皮甘草炙鳥梅肉焙縮砂仁 快牌飲子 十丸橘皮湯下食後 右件為細未用湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五 力 治脾胃虚弱中脘停寒不進飲食四肢無

してこうう ここう 変 人参散 殼神九 或腹脇脹滿臍腹污痛便利不調面黄肌瘦 米飲送下不拘時候 右件為細未煮類糊為丸如梧桐子每服五十丸温 煎至八分去滓温服食前 兩各 神勉炒麥蘖 甘草半兩 治脾胃虚弱不思飲食肢體倦怠 治脾胃氣弱飲食不消胸膈痞悶嘔吐惡心 陳橘皮去縮砂仁 普清方 丁香皮巴上 ě d

消積三稜煎 鱼好四母全書 疼痛 煎至一蓋去滓食前温服 右件為粗未每服五錢水一蓋半生薑五片豪三枚 半兩甘草之分 沉香為末檳榔為末京三稜 白茯苓皮黄耆氨附子炮去木香 人參或蓋白术兩大麥蘖炒陳橘皮去五味子 治脾胃虚弱少食多傷五積六聚氣塊 遊我术 肉桂七粗 鳥梅肉

次已日巨人的 **華澄茄丸** 消腹脇虚脹不思飲食面色養黄臟腑滑泄氣不 前項樂末一 焙氧為未入沉香等拌勻每秤未藥一兩用巴豆 右將京三稜蓬莪术二味碎到用酸醋浸一宿取 五枚去皮心膜細研以竹紙裹壓數次去油取霜 每服十九温生薑湯下食後 各一兩三 治脾虚胃弱氣滞不与心腹疼痛宿食不 兩再研与醋煮稀糊為九如梧桐子大 普酒方 柔 出

金月世居白雪 木香橘皮丸 下食前 每一兩作一十丸每服一丸細嚼橘皮湯或木香湯 右件除安息香外並為細末次入煉熟蜜半斤和丸 降 且競題裏機安息香爛濾沙石 華澄茄 霍香葉士人參頭 遊我术場香甘草 治脾胃虚弱飲食所傷久不消化或成 卷二十 五 半麝香一錢肉

大小り日本社 茯苓半夏湯 **羈絆於脾胃之間當先實其脾胃** 右件為細末醋煮髮糊為丸如梧桐子大每服十五 丸至二十丸食後臨臥熟水下 泄寫及氣不升降常服温脾胃快氣進飲食 木香分陳橘皮由青橘皮由京三稜地遊我木 烏梅连核用巴上共 肉桂去粗皮缩砂仁半黑牵 一微雨炒 治胃氣虚弱身重有痰惡心欲吐風 普済か 季 那

去租稍熱服食前 右件吹咀每服半兩水二大蓋生薑五片煎至一蓋 絆於脾胃之間當先實其脾胃 截天麻 白术 色 白术 白茯苓 半夏為一妙麵二大麥數半两 治脾氣虚弱身重有痰惡心欲吐是風邪羈 茯苓 半夏 卷二十

魏蘇九 21.17:11 /:Lin 進食 嘔逆惡心噫寒痞悶古乾咽燥口淡無味津液減耗 蓋去滓稍熱服之 右為細未蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼米飲 煩渴喜飲食已則吐腸鳴發泄常服温脾暖胃消穀 右件吹咀每服半兩水二蓋入生薑五片同煎至 治脾胃虚弱久不能食心腹脹痛食少多傷 1 神麴各三鳥梅 曹南方 兩各

多厅匹库全書 固真肥勝丸 蘿蔔子加丁香五粒等分滴水為丸每服十粒紫蘇 也可用楊氏家藏方內消脹丸用木香檳榔黑牽 柳等分黑牽牛蔔子同為散滴水為丸病必除膨脹 湯送下空心食前服之 之病皆由脾臟虚寒其證面目虚浮或時膨脹者是 不以時一方有甘草半兩臟寒膨脹是牌虛丁香檳 治脾元虚弱每食飽膩臟腑易泄腹鳴

養胃進食丸 治脾胃虚弱心腹脹滿面色痿黄肌肉 食消痰導風寒暑濕冷邪氣 消瘦怠惰嗜臥全不思飲食常服滋養脾胃進美飲 右為末糯米糊為丸如梧桐子米飲下三十九 蘆巴兩一當歸二東董 國 半厚朴生薑汁製 陳皮白大麥縣炒黄各首求 肉豆蔻製養术為三良薑 人參頭 甘草一兩白茯苓皮白术兩一神勉 苗香 破故紙炒胡

草豆蔻散 虚贏 亦得 右件九味為細末水煮數糊為丸如梧桐子大每服 三十丸至五十丸食前温生薑湯送下或粥湯送下 兩半夏 草豆蔻 米五 油水浸皮 治傷寒後脾胃虚弱痰逆不思飲食四肢 甘草 桂心分藿香 橘皮各半 白术 人参 黄青各

次已日日 三 健胖補不足之氣令人能食 治腹中虚冷不能飲食食軟不消羸瘦致令四肢匹 三合 百病因之耳 生地黄十斤搗絞取汁和加髮三斤以 日曝乾更和以汁盡止每食後服半合三日稍增至 右件藥捣節為散每服三錢以水一中蓋入生薑半 分煎至六分去滓不計時候稍熱温服 以江猪舌和五味煮取汁飲 当清方 卒 弱

又方 夫牌為倉廩之官胃為水穀之海二者氣盛則能運化 金ピノロをといる 盡又取桂心一小兩別搗為末內酒中每日平旦 空腹取一小蓋服之午時夜間各再一服甚驗忌 熱髮油膩等物 斗微火温之乗熱內猪胰中和萬葉相共煖使消 用猪胰一具細切以青萬葉相和以無灰酒一大 脾胃氣虚弱嘔吐不下食附 . 卷二 † 五 論

灰色日子 白馬 生胃丸出行 調補之 穀食紫養血氣若脾胃虚弱則氣化凝滯膈脘痞滿氣 方也兼治腹脇氣脹氣塊積滯不消 養脾性味和平大補倉麋為進食化痰之要劑真良 以南星粟米黄土為主益南星醒牌栗米養胃黄土 |逆腹脹水穀不消故令發嘔吐而不下食治法宜 治脾胃不足痰多嘔逆不思飲食此藥 普消方

右未温水為丸如菜豆大每服七十九次薑湯送 拘時候一方無三稜名生胃丹 夏麴炒二人参 白术 丁香不見 入南星四兩用真黄土屋有量 ■ 奉二 治脾胃魚虚弱嘔吐不下食臍腹脹痛積聚 樂 穀蘖炒砂仁 栗水一升用生薑二斤和京农南星漫火煨香取去土用太四兩用真黄土半斤將生薑 木香 神翹炒麥葉炒陳皮去防 沉香不見甘草矣而三稜 白豆蔻仁 青皮炒各 後皮南搗 和橘星潤 藥取切和 自广土 風 用 兩 之然焙包

スペンコシー とはず 華澄茄散出聖 肢不和食即嘔吐 右各等分搗羅為末每服三錢七温酒調下 不消 髙良薑對丹參 白术 妙陳橘皮治是去 厚朴去粗皮生 艾枝炙草豆蔻去 枳實幾人參 治脾胃虚弱不思飲食胸中氣滿四 大腹皮 哲清方 白芍藥 檳榔對吴茱萸為浸 桔梗對克木瓜 乾薑炮桂去

草豆蔻散出聖 多玩四年全書 右件樂搗粗羅為散每服三錢以水一 半分東二枚煎至六分去滓不計時候温服 四肢少力面無顔色 陳橘 華澄前一白豆蔻三分丁香三沉香再木香平 良董半桂心平白术 熟河梨勒去皮 去白 五白粮焙半夏 治脾胃氣虚弱臟腑積冷嘔吐宿食 をニナ 半兩 兩 七遍去 五 人参三分去 去湯清洗 蘆頭 朴三分去粗 東 重製料 中蓋入生薑 兩 炮 皮 唐

とこうら たま 丁香丸出聖 右件樂搗篩為散每服三錢以水一中蓋入生薑半青熟用白术兩甘草做赤對計炎各白术一甘草一分炎 人名皮臍 陳橋皮養培三分厚朴皮塗生薑 腹 分東三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服 草豆蔻二兩 妨悶 頭去 子去皮臍 陳橘皮機焙三分厚朴皮塗生子一兩炮製陳橘皮湯洗去白厚朴三兩去 蘆木香料前胡蘆頭 高良薑町 白茯苓 治脾胃氣虚弱食即嘔吐四肢不和心 皆清方 去湯 滑肉桂粗皮 人參分 蓝粗雨-

白术藿香湯 金月四年全書 大不計時候以薑棗湯下二十九 右件藥搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子 白茯苓二桂心一白术而甘草做赤對高良薑豆蔻一兩萬縣三陳橘皮去白張焙人參蘆頭丁香與河梨勒去皮 附子去皮臍 藿香興四樓全書 白术雨藿香雨丁香 人參 赤茯苓去黑半夏 剉] 治脾胃氣弱嘔吐不下食 草

火ビリ巨と島 白豆蔻湯 本甘草美到白檀香到一本甘草美到白檀香到一 右粗搗節每服三錢七水一蓋入生薑三片同煎至前胡去蘆頭一 七分去滓空心食前服日三 白豆蔻皮人参 白术两一 治脾胃氣虚弱嘔吐不下食 一去粗皮生 華草矣到 白茯苓去 厚朴去粗皮生陳橘 黑乾薑少兩丁香 半两横柳 + 15) 枚者五五

桔梗丸 金分世屋台電 下氣等疾 右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心温酒下十五丸 枚劈破同煎至七分去滓稍熱服 右粗捣飾每服三錢七水一盛入生薑三片大棗二 草食到各桂去粗皮草食料去粗皮生陳橘皮湯洗枳殼去穰乾薑炮甘 桔梗而吴茱萸湯洗焙白术 人参 茯苓去 治脾胃虚冷氣滿不能飲食嘔逆腹內雷鳴

Service Total 白术湯 治脾胃氣虚弱嘔吐不下食四肢無力宜服此 半分來三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服 加至三十九 治脾胃氣弱留飲停積飲食不化嘔吐不止 哲滴方 拉五

華族九 金分世月石書 白豆寇九出聖 拘時温服之 右剉如麻豆每服三錢七水一蓋煎至七分去滓不 冷痛冷類同八 桂去粗芍藥 白术妙附子炮火 陳福皮湯洗去白焙 各半兩少去複数炒 治脾胃虚冷嘔逆心腹常痛面色青黄腰將 味脾 治脾胃氣虚弱胸膈氣嘔逆不下食 枇杷葉去毛白茅根 虚 卷二十五 蘆根

厚朴湯出聖 とこうこう という 去滓下前丸藥 右為散每三銭用煎小麥汁一蓋入生薑半分煎六分 右為未以酒煮麪糊為九如梧桐子大每服二十九 不計時候温米飲下一方用此厚朴湯下 厚朴去粗皮人參去蘆陳皮二十草一 訶梨勒母女及各桂去粗白术 白豆蔻皮乾薑丸好實數木香 告済方 細辛去苗葉 半夏湯洗七遍 白茯苓散出聖 金丘四样全書 華操丸忠方 能飲食 大不計時候以生薑湯下二十九思生冷右件樂搗羅為未煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子 機去 桂 並 焙白 皴一 放皮 人多蓝頭 草薑製到 陳橘皮二人兩去人多一兩去 草薑一兩炮陳橘皮二換兩胡椒兩槟榔兩詞梨勒機去白茯苓四 治脾胃氣虚弱臟腑積冷或時嘔吐不 治脾胃氣虚弱胸中滿悶氣促嘔吐 卷二十五 浸兩 肉

白术散出聖 スミンフラー ハニア 要 心腹妨悶 右件樂搞粗羅散每服三錢以水一中蓋入生薑半 分東三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服 不能下食 茯苓白者一 五味子分草豆蔻半兩半夏三分湯洗甘草一分茯苓的者一陳橘皮為浸去人冬蘆頭白木分 剉] 治脾胃氣虚弱嘔吐不下食四肢少力 普洛方

盆定匹庫全書 枇杷葉湯 **東三枚煎至六分去海不計時候稍熱服** 右件樂搗羅為粗散每服三錢水一蓋入生薑半分 枇杷葉拭去毛厚朴去粗皮生前胡去篇白术 皮半兩湯浸厚朴並汁及令香熟白木兩人參盧頭 枳殼做去粮 皮白豆蔻一兩 茯神去陳橘皮湯浸去 半夏湯洗七遍去 治脾胃氣虚弱嘔吐不下食止逆進食 卷二十五 炒 阿熱勒四 桂心分陳橘

大三日日 白書 平胃丸出御樂 陰氧每服生薑湯嚼下三五九 痰 右為末衆肉與糯米粥和丸如梧桐子大丹砂為衣 右粗搗篩每服三錢七水一蓋入生薑五片煎至六 分去滓食前温服 半夏麴時 沉香兩木香 丁香各半麝香半截 白半 肉豆蔻皮檳榔出各青橘皮为是 治脾胃氣虚弱嘔吐不下食進食消 普濟方 兩去

雄白湯出聖 羸痩ツカ 滓温服之妙 右搗篩每服四錢七水一蓋半薑五片煎至八分去 強白七糯米各大東四陳橋皮三分湯洗枳實四 陳橘皮去白麥門冬去心好 治脾胃氣逆嘔吐不止心下澹澹 半夏湯洗去滑甘草乳白茯苓去黑竹筎 治胖氣虚弱不能飲食食即嘔吐四肢 卷二十 Б.

REDIST AIRE 藿香湯 時候稍熱服分二服 右件藥細到都以水一大蓋半煎至八分去滓不計 破同煎至七分去滓食前温服 右粗搞節每服三錢と水一蓋生薑二片來一 草三分 桂半兩 乾薑炒一枇杷葉武去毛 藿香葉 做黄生薑一 放四十 治脾胃氣虚弱嘔吐不下食 厚朴去祖皮生薑汁青橘皮湯浸去 普濟方 至九 月

|養香厚朴湯出脚樂 京三稜丸 煎至七分去滓温服不計時候 粗搗篩每服三錢七水一盖入生薑三片劈破 同妙黄去米陳橘皮湯浸去白入栗米一合陳橘皮湯浸去白七草生白茯苓去黑人參兩一 京三稜 霍香葉 治脾胃氣虚弱嘔吐不下食 厚朴去粗 **地碎益智士成各** 治脾胃氣虚弱嘔吐不下食 同皮 人参兩 半夏紫水浸一六同煮半日取出去 董事到以及用生 道二两切片豪十以 陳橘皮 焙二兩 同 遍宿焙牧 白

人參藿香湯 至七分去滓熱服 右粗搗篩每服三錢七水一蓋入乾木瓜二片同煎 右為末者數糊為丸梧桐子大每服十五丸食前用 生蓝水汤送下 高良薑分一甘草欠對 麥葉微炒人參半陳題搗作粗 人參兩藿香葉料白术 丁香 治脾胃氣虚弱嘔吐不下食 普洛方 枇杷葉拭去皮

半夏散出聖 参丸 參引子 頻食 半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服 右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中蓋入生薑 頭陳橘皮一兩湯浸白术 半夏半兩湯洗豆卷三分等香根三人參 恵方 出聖 治脾胃氣虚弱嘔吐不下食为見本門脾 治脾胃氣虚弱見食嘔吐 治脾胃氣虚弱食即嘔吐 卷二十五 婀 飲胃 兩

人工了了一个一 調中九出 空心食前服 右為細末滴水和丸如梧桐子大三二十九温水下 稍熱分為三服 右件樂細剉以水二大蓋煎取一蓋二分不計時候 青皮 整十 四 生薑料 論宣 蘆頭到甘草微赤到陳橘皮去白穰焙一兩去十草一分矣 陳橋 紅皮各一 治脾胃虚止嘔吐寬利胸膈 普濟方 大黄马牵牛两 遊白

一金厅四母全書 参香散 香附子散出宣 右用附子鑽孔四十九箇以丁香刺上面填內將生 取 子又填內蘿蔔益之又用文武桑柴火燒香熟為度 **董汁用文武火熬盡取大蘿蔔一箇取一穴子入附 盞調下日進三服** 出切附子作片子焙乾搗為細末每服一錢湯水 附子 治脾胃氣虚弱嘔吐不下食 煮 两 母丁香四十生薑半斤取自 治脾胃虚弱胸膈痞結吐逆不止 卷二十

次已日日 白雪 辛香散 五靈胎丸出財 此候効摩九方內用五靈胎不以多少為未狗膽汁 候服 右搗羅為細末每服二錢七煎柿蒂湯調下不拘時 右等分搗羅為散每服二錢空心熱米飲調下 細辛去苗葉丁香一 治脾胃虚弱嘔噦寒痰飲食不下 丁香 治吐逆粥飲藥不可下者可以應用 告濟方 さ

治脾胃虚弱食不消化嘔逆翻胃諸飲不下出財 金人世人 人工 粥法服 方煎熟生薑汁磨令極細更以少生薑酒化依前食 温粥飲半升令病人乗藥勢便以粥送下左手以患 和丸如雞頭實大每服一九煎熟生薑酒化下先煮 樂與不得嗽口右手急將粥與患人不令太多 空心鹽少和汁吞下 用栗米半升杆細水和丸如梧桐子大煮令熱點

Carona like 强中九出簡 參藿香湯出 飲食不下手足逆冷涎疾稠料又治欲喘不喘欲嘔 **蠆湯熟水任下加縮砂二兩尤妙 痞悶滿停痰留飲脇肋刺痛體重不食中酒用** 右為細末髮打稀糊為丸如梧子大每服四五十九 夏三炮 神勉炒陳皮去多葉妙乾薑炮良薑用少油炒半 易方 治脾胃宿冷嘔穢惡心噫氣吞酸心胸 治男子婦人脾胃氣弱嘔吐職 逆 告青か

神麴九出楊氏 金只四月全世 右為粗未入人參和自每服三錢水一蓋半生薑十 吐泄濕肠肋刺痛心腹脹滿方見本 片煎至一盏去浑通口服孕婦忌 口便吐服之立効久病反胃服百日安此樂温牌 不嘔徹心潰潰悶亂不安或瘴瘧諸疾水漿粥藥 化痰飲消宿冷止吐嘔 霍葉 人参切片各 治陰陽不和 半夏湯洗七次 脾胃虚弱氣不升降 頻門 半蓝 嘔 胃

則能行其津液而充養肌內若脾胃虚弱不能運化水 夫水穀精微化為血氣外禁肌體內充臟腑脾胃氣和 穀則氣血减耗無以灌溉形體故肌肉不豐而羸瘦也 治胃氣弱不下食至效日 ころうし ここう 用萬合鮒魚為羹食之 患方里 脾胃氣虚弱肌體藏瘦附論 治脾胃氣久弱不思飲食肌體羸少 寄育方 出本

郵定四庫全書 腹肠疼痛面色痿黄 右為細未煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服 不計時候以温酒下三十九忌生冷油膩濕麫 丁香平當歸一兩判 熟 白木兩檳榔三可梨勒煨用 劃] 兩人參 虚明去 白茯苓兩厚朴二兩去 乾薑半兩炮 白芷再內豆蔻去桂心分 枳殼樣 縮砂去 《各三分》 微黄去 矣粗 黄 人者 香笙 Ξ

草豆蔻散 不欲飲食日加羸瘦體虚顫掉 右件藥搗羅為散每服三錢以水一中蓋入生薑半 分來三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服忌生冷 去藍白芍藥 兩 厚朴生薑汁炙令香熟芎藭 柴胡去桔雨附子去皮臍 白茯苓三當歸炒 松實幾半 草豆蔻去青橘皮湯浸去白粮人參蘆頭去 頭 惠方里 、 黄耆半兩 治脾胃氣久虚四肢無力腑臟虚損 黄炒 梗 10

發定匹庫全書 訶梨勒散出聖 少力大小便不調或加氣促與食减 右件樂搗篩為散每服三錢以水一中蓋入生薑半 油腻濕麪猪肉犬肉 當歸到微 甘草 薑 訶梨勒 山東 秋二 徴 皮用木香 分炙 赤 灭 到白术 牛膝各三分桔梗去蘆肉桂去做皮 仁涉浸去皮尖雙仁東橘皮 治脾胃氣久虚腹肠脹 - i ナブ 鼈甲產醋矣令川大黄到 枳 殿 黄去粮 白芍藥分 潚 去白根湯 肌體羸瘦 焙浸 乹 微

文已日日 白馬 ,香散忠方 時痰逆不思飲食 莱 分煎至六分去滓食前温服忌生冷油腻牛犬肉莧 焙湯 焙各三分枳殼粮各半雨 甘草微赤剉湯洗去粮枳殼幾炒微黄去甘草一分炙皮附子炮蟹去可梨勒皮 半夏遍去滑陳橘皮 競皮白术 人参頭 黄耆到白茯苓 丁香 高良薑三分厚朴盖汁炙令香惠 草豆 治脾胃氣虚弱肌體羸瘦四肢少力或 肉桂去

金万口因人言 補中黄者九出聖 食四肢少力 分來三枚煎至六分去滓不計時候温服 右件藥搗篩為散每服三錢以水一中蓋入生薑半 冬时冬去心當歸炒做五味子的半石斛去根人 事者 白茯苓分二桂心 山茱萸 白术分 頭 附子皮臍 陳橘皮半兩湯沒熟乾地黄去蘆 治脾胃氣虚弱肌體羸瘦不思飲

をこりに 白い 多散息方 今香熟白花一号之, 人参盖頭 柴胡去苗 白茯苓雨后人参一两去 柴胡去苗 白茯苓雨后 腸不調有時痰逆不思飲食四肢少力 犬肉 大每服不計時候以賽湯下三十九是生冷油膩牛 右件樂搗雖為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子 東耆對當歸到微霄下子一白水一結梗一兩去 陳橘二兩湯浸去 治脾胃氣久弱肌體羸瘦或加勞瘁 普済か ŧ

金戶口母子書 沉香丸 右除的砂阿魏外捣研為細末將的砂阿魏用好 分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服 右件樂搗篩為散每服三錢以水一中蓋入生薑半 各一 沉香到附子皮臍 厚朴盖升矣 白术 判桂心分半夏 一兩 棟實取皮內阿魏 內豆蔻去懷香子 做妙胡叔 治脾胃氣虚弱肌體羸瘦 七遍去消 码砂無石者 陳麴炒桃仁生 隹 芎蘇 研

マハラル ニニデ 人參丁香散比醫方 藥不下凡嘔吐之病皆因三焦不調脾胃虚弱冷熱 運化胸膈痞悶嘔逆惡心腹滿脹痛短氣噎悶咳逆 不和邪正相干清濁不分陰陽錯亂停痰留飲不能 阻病心中煩情頭目眩重憎聞食氣嘔吐煩 痰水噫酷吞酸不思飲食漸至羸瘦及療女人妊娠 早晨晚間腹空時茶酒鹽湯嚼下二十九 升銀銅石鍋内熬成膏和上藥件丸如梧桐子大 替清方 治大人小兒嘔吐不已粥飲湯 問顛

多丘匹库全書 右㕮咀每服五錢水一 脾胃虚極中滿嘔逆全不入食並宜服之 不安四肢困弱不自勝持多臥少起又治久病羸弱 四歲以下更宜量數加減與之常服和脾胃進飲食 小兒二歲可服半錢水五分蓋生薑一片同煎温 妙白术 火莲莪木 白芍藥作當歸盖丁香 甘草各四 參去蘆各乾薑地茯苓去香附子 蓋薑三片煎七分空心温服 山藥路 兩 凹 肉桂 服

No bear lust 肉豆蔻丸 黄耆煮 煎至七分不以早晚温服 虚倦强心力 右杵未毎服二錢七水一盞入生薑三片棗二枚劈 兩半夏一兩半取汁浸一宿焙乾乾薑炮一火炙盡各一兩 詞梨勒一兩半木香 十畫二兩取汁塗漫河梨勒炮去核 十 黄耆剛二人參 白茯苓去黑葛根割厚朴去粗 治脾胃氣虚弱肌體羸瘦美飲食長肌肉去 治脾胃虚弱肌體羸瘦 皆再な 甘草矣

弘定匹庫全書 人参湯 右除硫黄外細搗羅為末同拌勻煉蜜丸如梧桐 大空心米湯下三十九 肉豆蔻去 教一 胡五鷹陳福皮湯沒去 葉 風去厚朴去粗皮生 頭 治脾胃氣虚弱肌體羸瘦 獨活 各一分石硫黄 **訶梨勒熨裹火炮** 将生 董汁製草豆處皮大腹皮到前湯洗七次去草豆處去大腹皮到前 芎藭 别一研雨 二粗与藥 養未常切焙 兩吳茱萸為浸焙 藿香 防

大江りら 江南 思食補益人參散出聖 右件樂搗粗罪為散每服三錢以水一中蓋入生薑 體贏瘦四肢無力 分切大棗二枚劈煎至八分去沒稍熱服不計時候 右各等分粗搗篩每服三錢七水一蓋半入生薑半 人参去蘆白木 判附子腑各一兩桂心再木香再甘草做赤對人參頭 白木 陳橘皮的狼焙五味子 黄 皮當歸切 首清方 治脾胃氣虚弱不思飲食肌 黄耆

金戶四月子書 陳橘皮煎丸 調中思食丸 子每服二十九温米飲下食前服 右 半分聚三枚煎至六分去滓不計時候温服 除鐘乳别入外捣羅為末拌与煉蜜為丸如梧 乳 陳麴楊碎炒陳橋皮湯沒去人 焖 粉 檳榔 治脾胃虚弱面黄肌瘦腰膝 治脾胃氣虚弱肌體羸瘦 者 白术 半夏麴 枳殼去粮 麥葉炒黄 半麸 鍾 桐

大三日 上 附子丸出里 取二京三稜地熟到厚朴去粗皮生薑汁取二京三稜地熟到厚朴去粗皮生薑汁鹿炮柱去粗草斛到二附子腌各四两党陳橘皮一斤用水浸去白草杵為細沉香 食前服 右九味搗 雞八味為細末用陳橘皮膏和丸如梧桐 嘔逆腹脇疙癖氣痛 子大每服二十九温酒下不嚼陳米飲下亦得空心 陳橘皮一斤用水沒去白草 恵方 治脾胃氣虚弱肌體羸瘦食不消化不 普濟方 沉香到二 當歸洗 兩汁 轧切 乹

金分世母子書 團參九 能飲食 大不計時候以薑水湯下二十九忌生冷油膩犬肉 右件樂搗羅為末煉蜜和搗三二百杵九如梧桐子 風參 草一分泉當歸三分到小麥麵二附子一兩炮製桂心三厚朴三兩 炒及 出閉 治脾胃氣虚肌體羸瘦 汗口 山芋 卷二十五 為未陳倉米各一兩甘始東東 今两足去 黄微令粗 香皮]]] 熟塗 去二 生 白兩 甘

香柿丸 山芋丸 7:17:1 / Sign 痛不能飲食 右為細末煉蜜為丸如梧桐子每服二十九或三十 右為細末煉蜜丸如櫻桃子大米飲下一丸日三服 九温米飲下食前服 山芋剛一五味子淨揀黃耆細對白术兩人參 治脾胃氣虚弱肌體羸瘦補不足進飲食 治脾胃氣虚弱面黄肌瘦小便頻數臍腹疼 草豆蔻去皮 普濟方

蜀椒丸 右除紅椒沉香懷香子外二味用浆水六升青鹽三 梧桐子大每服三十九空心温酒下 兩生薑三兩切作片子同於銅鍋中煮令水盡暴乾 食 极取紅 紅椒沉香懷子揭羅為細末以水浸炊解和丸如 沉香到懷香子炒各厚朴去粗 治脾胃氣虚弱多困羸瘦面黄口淡不思飲 皮 附子去 皮臍 用 蜀

Lata Friday 椒 朴丸出他 乾同杆為未煉蜜并糯米粉同為糊和丸如梧桐子 右以水一斗於銀器內以文武火熬候水盡為度焙 漸羸瘦四肢衰倦吐利無節應脾虚候上皆可服 大每服二十九温酒空心服如大腸滑泄生薑米飲 二两 題花雨 口者十兩厚十並汁矣令香熟去目及閉厚卜去粗皮十兩以生 治脾胃虚冷不思飲食或發虚腫或日 普洛方 附子炮製

金戶四屆全書 嗜食其甥為本道轉運使日遣良醫治之都不效有 他藥余中表許君病脾逾年通身黃腫不能起全不 大每服三四十九空心温米飲下及鹽湯下病深者 右以水二升煮令乾焙燥捣羅為末數糊丸如梧子 日三服諸方集多載椒朴丸有加附子者有加乾薑 之類者皆不快提此方精要與病相當如神慎勿增 蜀椒去目并厚卜去粗皮生懷香子炒青鹽淘去且月子 淨 婀

大三日三 台 栗附九 奇功多因增益他樂却致不驗此難可以意度也 方治通身黄腫不能起全不食服之愈 傅主簿傅此方服十許日漸安自爾常服肌膚充實 嗜飲美食兼人面色紅潤年六十餘日行數十里强 濕大便頻全不飲食 力如少年凡藥之中病處人多不惻看不上面自有 陳栗米十附子而枚者 治脾胃氣虚弱四肢倦怠肌體瘦弱臟腑受 公

羊肉補真凡出楊氏 金月口月石 問肌體羸弱全不入食 和丸如梧桐子大每服三十九至五十九陳橘皮湯 右同於鍋銚内入水煮令附子透取出附子切作 下空心食前 令香熟同附子碾為末却取元煮附子者栗米粥同 子焙氧又别取陳粟米半升水淘令淨控乾文武妙 羊肉炎或者 當歸洗白术 治脾胃久虚禁衛氣流精神昏 片

DE DIE LIMIT 建脾九出揚氏 口苦無味肢體羸困全不思食 腑溏泄停飲食不消惡心嘔逆咳嗽上氣乾噦涎沫 桐子大每服三十九至五十九温米飲下不拘時候 右件為細末次入羊肉末拌与湯浸蒸餅為九如梧 丁香 苗香炒肉豆蔻要表縮砂仁 各一两糯水炒黄上六味糯水半升 甘草西 內豆蔻題表細辛去葉附子炮 治脾胃久虚心腹疼痛脇肋脹满臟 普濟方 乾薑 炮內桂去

治脾胃腸癖出本 夫脾氣壅實胃有熱則陽氣盛陽氣盛則胸膈滿痰飲 九米飲送空心食前 右件為細末煮栗米飯為丸如梧桐子大每服五十 **计製二兩去粗皮生薑** 以野萬煮令熟醬醋食之 肉桂去粗 吴茱萸涉洗七载 董地已上六厚朴 脾胃壅熱嘔城 附論

Kandana Line 中久多積熱致上焦不利故令嘔噦也 杜把葉散出聖 積聚則成嘔城此皆氣力强盛之人肌膚充滿脾胃之 右件樂揭節為散每服四錢以水一中盖入生薑坐 橘皮半两湯浸 頭麥門冬去心麻心兩犀角屑再赤茯苓三陳去蘆麥門冬一兩麻心半犀角屑半亦茯苓三陳 机把禁一两找去毛木通平前胡雀頭 去白旗焙 治脾胃氣壅痰滞嘔噦見食即吐 普濟方 半两去人

麥門冬散出里 鱼只四母全書 吐 分煎至六分去滓不計時候温服 右件樂揭篩為散每服三錢以水一中蓋入生薑坐 分煎至六分去滓不計時候温服 净 陳橘皮本面湯浸茶根二兩甘草與兩人麥門冬去心赤茯苓兩人麥盧頭 半夏六雨 胡盧頭 枇杷葉一雨找去 治脾胃壅嘔城不下食縱食良久即 卷二十五 遍湯

ころこうこと ころう 又方息方 陳橘皮散出聖 分煎至六分去滓不計時候温服 右件藥搞篩為散每服四錢以水一中蓋入生薑半 麥門冬一兩枇杷葉半兩杖去 陳橋皮一兩湯浸人冬一兩去 葛根兩盧根一 蘆頭 陳橘皮二兩湯沒羊角屑再麥門冬三两 頭 澤寫非紫蘇散 治脾胃壅熱嘔噦煩渴不下食 替香方 兩 兩

鱼丘匹库全書 蘆根飲子出 右件樂細對和与每服一兩以水一大蓋半入生薑 分煎至六分去滓不計時候分温二服 右件樂細剉和匀每服半兩以水一大蓋入生薑半 三片煎至一蓋去滓入蜜一匙生地黄汁半合更煎 茹雨陳橘皮去白狼焙 蓝根半 麥門冬去心人參盧頭 黄耆雨淡竹 雨沸不計時候分温三服 惠出 方聖 治脾胃積熱胸膈煩壅嘔喘不下食 卷二十五

改定四重全書 ! 茅香散出聖 人参飲子 温服 右件樂揭篩為散每服三錢以水一中蓋入生薑坐 分竹茹一分糯米五十粒煎至六分去粗不計時候 **微赤到杜把葉三分找去** 茅香花二蘆根一 頭 前胡去蘆頭生薑料栗米半雄白生 出聖 治脾胃壅熱嘔噦煩渇不止 治脾胃壅熱氣滿不能食縱食嘔噦 普濟方 到兩麥門冬三分赤茯苓三甘草

蘆根散出聖 右件樂揭節為散每服三錢以水一中蓋入生薑坐 粗不計時候温三服 右件藥細對和勻都以水二大蓋煎至一蓋二分去 分煎至六分去滓入生地黄汁半合更煎 蘆根二两人多蘆頭 甘草做赤對麥門冬去茯神 兩 ノニアリ 治脾胃壅熱嘔噦不能下食心神煩 一两沸 亂

